

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Endoscopia del tracto superior, ERCP, PEG (sonda de gastrostomía) y ecografía endoscópica



Endoscopia del tracto superior

- con dilatación
- con inyección de bótox
- con remoción de endoprótesis
- con colocación de bandas

ERCP

- con remoción de endoprótesis

PEG (sonda de gastrostomía)

- cambio/remoción

Ultrasonido endoscópico

- con aspiración por aguja fina

PACIENTE: _____

Sede (vea el mapa al dorso):

- Enloe Outpatient Center
- Enloe Medical Center Main Campus
- Skyway Surgery Center

Se ha programado su procedimiento con:

- Dr. Stephen Pearce
- Dr. Peter Bangsund
- Dr. Hoan Tran
- Dr. Uzma Abbasi
- Dr. Shaheen Rasheed

Fecha del procedimiento _____ **Hora estimada de admisión** _____

El establecimiento lo llamará para informarle la hora exacta de llegada la tarde antes de la prueba.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Debe venir acompañado con alguien que lo conduzca a casa después del procedimiento porque estará sedado. Si no viene acompañado de un conductor, se reprogramará su procedimiento. Por favor traiga su tarjeta de seguro, identificación, información de admisión totalmente completada y la lista de medicamentos, cuando venga para su procedimiento. **Si es diabético**, consulte con su médico de cabecera cómo tomar los medicamentos el día del procedimiento, ya que es necesario que haga ayuno. **Si tiene alguna pregunta, llámenos al consultorio al (530) 332-3986.**

Información importante sobre los medicamentos – POR FAVOR, LÉALA DE INMEDIATO: Si toma cualquiera de los siguientes medicamentos, debe dejar de tomarlos antes del procedimiento. Consulte al proveedor que se los recetó para obtener instrucciones.

Xarelto (Rivaroxaban) - 2 días

Pradaxa (Dabigatran) - 2 días

Aspirina - Si no se la recetó un proveedor, deje de tomarla 7 días antes del procedimiento

Eliquis (Apixaban) - 2 días

Coumadin (Warfarin) - 5 días

Plavix (Clopidogrel) - 7 días

Brilinta (Ticagrelor) - 7 días

Effient (Prasugrel) - 7 días

Aggrenox - 7 días

**Si tiene preguntas sobre estas u otras indicaciones, llame al consultorio lo antes posible, al (530) 332-3986.

NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE Y BEBA SOLO LÍQUIDOS CLAROS HASTA 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento o la preparación, comuníquese con el asistente médico de su médico, al (530) 332-3986.

Chico


CALIFORNIA



**Enloe Medical Center
Main Campus**
1531 Esplanade

*Ingrese por la entrada noroeste
del pabellón quirúrgico*

Enloe Outpatient Center
888 Lakeside Village Commons



La endoscopia de la parte superior del aparato gastrointestinal

La endoscopia de la parte superior del aparato gastrointestinal permite que su proveedor de atención médica pueda mirar directamente esta parte del organismo, la cual está formada por el esófago, el estómago y el duodeno (la primera sección del intestino delgado).

Antes del examen


Siga estas instrucciones y otras que le den antes de la endoscopia. Si no sigue las instrucciones del proveedor de atención médica al pie de la letra, podrían tener que cancelar la prueba o repetirla.

- No coma ni beba nada después de la medianoche anterior a la prueba. Si va a ser por la tarde, beba solo líquidos claros en la mañana, y no coma ni beba nada 8 horas antes de la prueba. En algunos casos, es posible que pueda tomar sus medicamentos con un sorbo de agua hasta 2 horas antes del procedimiento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de esto.
- Lleve consigo radiografías y otros resultados de pruebas que le hayan hecho antes.
- Como va a estar sedado (muy relajado por efecto de los medicamentos), pida que alguien lo lleve a casa después de la prueba.
- Antes de la prueba, dígame a su proveedor de atención médica qué medicamentos toma y si tiene algún problema de salud.

El procedimiento

Esto es lo que puede esperar:

- Le pedirán que se acueste en una mesa de endoscopia. Por lo general los pacientes se recuestan del lado izquierdo.
- Lo monitorearán y le darán oxígeno.
- Con un atomizador o líquido para hacer gárgaras le adormecerán la garganta. También le darán medicamentos a través de una sonda intravenosa (IV) para que se sienta más relajado y cómodo. Durante el procedimiento, puede estar dormido o despierto.
- El proveedor de atención médica pondrá el endoscopio por la boca y lo hará bajar por su esófago. Este tubo es más delgado que muchos de los trozos de comida que come. No tendrá problemas para respirar. Los medicamentos que le dieron ayudan a evitar que le dé arcadas.



Durante la endoscopia se introduce un tubo largo y flexible para ver el interior de la parte superior del tracto gastrointestinal.

- Se introduce aire para expandir el tracto gastrointestinal, lo cual puede hacerle eructar.
- Durante el procedimiento, el proveedor de atención médica puede tomar biopsias (muestras de tejido), remover anomalías como pólipos, o tratar las anomalías por medio de una variedad de dispositivos que se colocan a través del endoscopio. Usted no sentirá esto.
- El endoscopio lleva imágenes del tracto gastrointestinal superior a una pantalla de video. Si usted está despierto, podría ver las imágenes.
- Después del procedimiento, descansará un rato, y luego un adulto deberá llevarlo a casa.

Llame al proveedor de atención médica:

Contacte a su proveedor de atención médica si tiene:

- Heces negras similares a la brea; sangre en las heces
- Fiebre
- Dolor persistente en el estómago
- Náuseas y vómito, o vomita sangre

© 2000-2018 The StayWell Company, LLC. 800 Township Line Road, Yardley, PA 19067. Todos los derechos reservados. Esta información no pretende sustituir la atención médica profesional. Sólo su médico puede diagnosticar y tratar un problema de salud.